


# Plan d'urgence pour l'anaphylaxie /EpiPen \_\_\_\_\_ (NOM)

A remplir chaque année

**Cette personne présente une allergie grave (ou anaphylaxie) pouvant être fatale aux allergènes suivants :**



(Cochez les cases appropriées.)

Aliment (s) : \_\_\_\_\_

Piqûres d'insectes \_\_\_\_\_

Autre : \_\_\_\_\_

**Auto-injecteur d'épinéphrine :** date d'expiration : \_\_\_\_\_

**Dosage :**

EpiPen<sup>MD</sup> Jr. 0,15 mg     EpiPen<sup>MD</sup> 0,30 mg

**Où trouver les auto-injecteurs :** \_\_\_\_\_

**Antécédents de réactions anaphylactiques :** La personne présente un risque plus élevé.

**Asthme :** La personne présente un risque plus élevé. Si, lors d'une réaction, elle éprouve de la difficulté à respirer, lui administrer de l'épinéphrine avant de lui faire prendre ses médicaments contre l'asthme.

**Quiconque fait une réaction anaphylactique peut présenter N'IMPORTE LEQUEL des signes et symptômes suivants :**

- **Système cutané (peau) :** urticaire, enflure (visage, lèvres, langue), démangeaisons, sensation de chaleur, rougeur
- **Système respiratoire (poumons) :** toux, respiration sifflante (silement), essoufflement, douleur ou serrement à la poitrine, serrement de la gorge, voix rauque, congestion nasale ou symptômes de type « rhume des foins » (nez qui coule ou qui pique, larmolement, éternuements), difficulté à avaler
- **Système gastro-intestinal (ventre) :** nausée, douleurs ou crampes, vomissements, diarrhée
- **Système cardiovasculaire (cœur) :** peau plus pâle que la normale ou bleutée, faible pouls, perte de connaissance, étourdissements ou vertiges, état de choc
- **Autres symptômes :** anxiété, sentiment de danger imminent, maux de tête, crampes utérines, goût métallique dans la bouche

*La détection précoce des symptômes et le traitement immédiat pourraient sauver une vie.*

**Intervenez rapidement. Les premiers signes d'une réaction peuvent sembler légers, mais les symptômes peuvent progresser très rapidement.**

1. **Administrez l'épinéphrine avec l'auto-injecteur (EpiPen<sup>MD</sup>)** au premier signe d'une réaction déclarée ou soupçonnée. (Voir les instructions ci-jointes.)
2. **Appelez le 9-1-1** ou les services médicaux d'urgence locaux. Dites que quelqu'un fait une réaction anaphylactique pouvant mettre sa vie en danger.
3. **Administrez une deuxième dose d'épinéphrine** aussi rapidement que 5 minutes après l'injection de la première dose si les symptômes ne s'améliorent pas.
4. **Rendez-vous à l'hôpital le plus proche (idéalement par ambulance)**, même si les symptômes sont légers ou se sont atténués. La réaction pourrait s'aggraver ou réapparaître même après un traitement approprié. La personne doit demeurer en observation à l'hôpital pendant une période suffisante, soit généralement de 4 à 6 heures, selon l'évaluation du médecin de l'urgence.
5. **Communiquez avec une personne à aviser en cas d'urgence (parent, tuteur ou autre).**

**Personnes à aviser en cas d'urgence**

| Nom | Lien avec la personne | Téléphone à la maison | Téléphone au travail | Téléphone cellulaire |
|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|     |                       |                       |                      |                      |
|     |                       |                       |                      |                      |
|     |                       |                       |                      |                      |

*Le soussigné, patient, parent ou tuteur, autorise un adulte à administrer de l'épinéphrine à la personne susnommée dans le cas d'une réaction anaphylactique telle que définie précédemment. Ce protocole est recommandé par le médecin traitant.*

Signature du patient, du parent ou du tuteur

Date

